

BOIS DE LA BERGETTE

Synthèse des observations de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)



Triton alpestre

LC

Le Triton alpestre occupe des habitats assez variés et est observable dans différents milieux à proximité d'un point d'eau. Il fréquente les eaux stagnantes des mares, étangs, marécages, ornières, fossés et ruisseaux forestiers, mais aussi des milieux plus artificiels (canaux, abreuvoirs...). L'Île-de-France est située en limite d'aires de répartition, ce qui rend son statut difficile à évaluer.

Localisation : Bois de la Bergette.



Coronelle lisse

NT

La Coronelle lisse est un serpent totalement inoffensif. Cette petite couleuvre assez discrète se nourrit quasi exclusivement de lézards. Elle fréquente donc les milieux pierreux et rocaillieux, habitats préférentiels de ses proies favorites. Ainsi, l'abandon de certaines voies ferrées peut avoir un effet bénéfique sur la dynamique des populations. En revanche, la fermeture des tas de pierres abandonnés et la remise en état de vieux murs peut contribuer au déclin de l'espace.

Localisation : Bois de la Bergette.



Murin de Daubenton


EN

Le Murin de Daubenton fait partie des espèces particulièrement adaptées au glanage de proie à la surface de l'eau. L'état de santé de ses populations est donc lié à celle des milieux humides. C'est une espèce considérée comme sédentaire.

Depuis quelques années, les chiroptérologues régionaux semblent observer une diminution des populations de Murin de Daudenton. Le déclin est aujourd'hui constaté de manière unanime non seulement dans la région Île-de-France mais aussi dans le reste du pays.

Localisation : *Bois de la Bergette, Petit Morin.*

PRÉSENTATION DES CATÉGORIES DE L'UICN



Présentation des catégories de l'UICN utilisées à une échelle régionale

(d'après le Guide 2012 et le Guide régional 2012 de l'UICN).

9 février 2023

MAIRIE DE LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE

Place de l'Hôtel de Ville
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
01 60 22 25 63

Nous contacter

